



CATÁLOGO 2024

PLUS TRAP

SÜSBIN



CÓDIGO: AT-SB-0008

Descripción:

Plus Trap® es un cebo libre de insecticidas listo para usar con un poderoso atrayente para *Ceratitis Capitata* y *Anastrepha spp* que mediante la emisión de compuestos volátiles ejerce una poderosa atracción, sobre todo en hembras de las especies, que son atraídas hacia el interior de la trampa y al no poder escapar mueren por ahogamiento en su interior.

Contiene Hidrolizado de proteínas 84% p/p; Aditivos 7% p/p; Conservantes 9% p/p.

Características:

- **Específico.** Plus Trap® es un atrayente alimenticio específico para *Ceratitis Capitata* y *Anastrepha spp* de elevado contenido proteico que ejerce un elevado poder de atracción sobre todo en hembras.
- **Limpio.** Plus Trap® es un producto biológico libre de insecticidas
- **Listo para usar.** Plus Trap® no es necesario diluir, ni agregar otros productos
- **Económico.** Plus Trap® permite el recambio de las trampas mediante su bidón de recarga económica
- Tiene una duración de **más de 30 días** (dependiendo de las condiciones climáticas)
- De **toxicidad baja**.

Packaging Estándar:

Caja por 10 trampas (600 trampas por pallet de 1 x 1,20 x 1,75 m.)

Forma de Uso:

Plus trap® se encuentra listo para usar. No es necesario agregar aditivos ni diluir el producto, se debe quitar la faja, colgar del árbol y listo.



5959314532
5959574850



ventas@grupofitoozoo.com.mx



www.grupofitoozoo.com.mx



La cantidad de **Plus trap®** por hectárea dependerá de la presión, dinámica de la plaga y tipo de cultivo a proteger con un mínimo de 70 trampas por hectárea.

En la disposición de las trampas se deberá prestar especial atención a la dinámica de la plaga dentro del predio, reforzando en los lugares donde se detecte mayor presión.

Colgar **Plus trap®** a 1,5 m. del suelo en la parte soleada de la planta evitando que ramas u hojas obstruyan los orificios de ingreso.

Plus trap® deberá reponerse antes de que se evapore totalmente. El intervalo de tiempo para su reposición podrá variar según la temperatura, humedad, exposición a la luz solar, etc.

Cultivos	Plagas	Dosis	Momento de aplicación
<p>Cítricos: naranjo, mandarino, durazno.</p> <p>Frutales de carozo: durazno, ciruelo, olivo damasco.</p> <p>Frutas de pepita: peral, manzana, uva.</p> <p>Frutales tropicales: mango, guayaba, etc.</p>	<p>Moscas de la fruta: Ceralitis Capitata, Anastrepha spp.</p>	<p>Mínimo 70 trampas por ha dependiendo de la presión y dinámica de la plaga.</p>	<p>El momento de aplicación, concentración y número se determinará según los umbrales de daño económico a través de trampas atractivas para la detección de moscas adultas. Se sugiere monitorear estas trampas al menos dos veces por semana.</p>

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco evitando su exposición a la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

Normas de Seguridad:

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas. Manipular con guantes, lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión provocar el vómito y consultar de inmediato a un médico.

Advertencias:

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la trampa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este producto. **FITOZOO** no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.



5959314532
5959574850



ventas@grupofitozoo.com.mx



www.grupofitozoo.com.mx