



CATÁLOGO 2024

PLUGS DE TRIMEDLURE · TMD

SÜSBIN



CÓDIGO: FR-SB-0005

Descripción:

Los plugs de trimedlure TMD Susbin son utilizados como atrayentes sexuales de los machos de *Ceratitis Capitata* con fines de monitoreo. Pueden utilizarse en Trampas Jackson (recomendado), Trampas McPhail o Mosqueros.

Características:

- Color: **rojo**.
- Concentración: **2 gr. IA; 4 gr. IA**
- Soporte: **matriz polimérica**
- Toxicidad: **atóxico**
- Duración: 2 gr. IA **45 días** (dependiendo de las condiciones ambientales); 4 gr. IA **90 días** (dependiendo de las condiciones ambientales).

Packaging Estándar:

Caja por 1.000 unidades en sobres herméticos de 2 unidades cada uno.

Forma de Uso:

Utilizar en trampas Jackson (recomendado) dentro de la canastilla porta feromonas. Semanalmente deben controlarse las capturas a fin de determinar correctamente el MTD de la trampa para aplicar las medidas de control oportunamente.

$$\text{MTD} = \frac{\text{Número total de moscas}}{(\text{Núm. de trampas} \times \text{Núm. promedio de días de las trampas en campo})}$$

5959314532
5959574850

ventas@grupofitoozoo.com.mx

www.grupofitoozoo.com.mx



Las moscas de las frutas se aparean en las copas de los árboles por protección a predadores y el viento, por tal motivo, las trampas deben estar ubicadas cerca de los frutos en el tercio medio superior del árbol, dejar lo menos posible expuestas al sol y evitar que la entrada de la trampa se encuentre obstruida por ramas o cualquier otro elemento.

Conservación:

Se recomienda su conservación en los envases originales en un lugar fresco y seco, evitando su exposición directa a la luz solar.

Normas de Seguridad:

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas. Manipular con guantes, lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión provocar el vómito y consultar de inmediato a un médico.

Advertencias:

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la trampa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este producto. **FITOZOO** no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.

Las moscas de las frutas se aparean en las copas de los árboles por protección a predadores y el viento, por tal motivo, las trampas deben estar ubicadas cerca de los frutos en el tercio medio superior del árbol, dejar lo menos posible expuestas al sol y evitar que la entrada de la trampa se encuentre obstruida por ramas o cualquier otro elemento.



5959314532
5959574850



ventas@grupofitozoo.com.mx



www.grupofitozoo.com.mx